



치주질환 치료후 주의사항에 관련된 질문

*마취가 얼마나 오래 지속됩니까?

-마취: 보통 수술후 1~2시간 마취가 지속되나 좀더 계속될 수도 있습니다. 입안이 마취됐을 때는 입술, 혀, 불이 찝힐 수가 있습니다. 따라서 마취가 완전히 풀리기전에는 음식을 드시지 않는 것이 바람직합니다.

*치주질환 치료후 잇몸에서 피가 납니다?

-출혈: 환자분의 잇몸 상태에 따라 다르지만 어떤 경우는 24시간까지 피가 날 수 있으며 전혀 출혈이 없는 경우도 있습니다. 만약 출혈이 48시간이상 지속될 때에는 상태를 체크해야 하므로 저희에게 연락주십시오.

*통증이 어느 정도인가요? 직장에서 바로 근무할 수 있나요?

-통증: 치료후 아프거나 불편함을 느끼실 때는 타이레놀 또는 애드빌, 모트린 등의 진통제를 쳐방대로 드시면 됩니다. 잇몸이 민감해지거나 다소 통증을 느끼는 경우에는 티스푼 절반정도의 소금에다 미지근한 물 8온스를 섞은 소금물로 입안을 헹구시면 훨씬 나아집니다. 근무하시는 데는 전혀 문제가 없으나 마취가 풀린 후 통증을 느끼시면 앞서 언급한 진통제를 드시기 바랍니다.

*수술 당일 저녁 양치질을 하거나 치실을 사용할 수 있나요?

-구강위생 요령: 양치질이나 치실 사용을 저희가 알려드린 대로 하시는 게 좋습니다. 양치질과 치실 사용으로 치석 등을 제거해주시면 치료효과가 더욱 좋아지기 때문입니다. 치주질환 치료후 하루나 이틀정도 침 색깔이 핑크색인 것은 정상이므로 염려하지 마십시오.

*치료후 식사를 조절하고 부드러운 음식만 먹어야 하나요?

-음식섭취: 마취가 풀린 후에는 어떤 음식이라도 드실 수 있습니다. 만약 흡연을 하시는 경우에는 치료후 며칠간은 흡연량을 평소보다 줄이십시오. 흡연을 많이 하게되면 치료 효과가 줄어들 뿐 아니라 잇몸 조직을 자극해 염증을 유발할 수도 있으므로 주의하시기 바랍니다.

*치주질환 치료후의 진료과정은?

-치료후 진료과정: 치과의사가 치료후 보통 3~4주후에 경과를 체크하게 됩니다. 이 진료는 매우 중요하므로 절대적으로 지키셔야 합니다. 저희가 환자분의 잇몸질환을 치료해드리지만 저희도 환자분의 협조가 필요합니다. 이 진료과정에서 수술 등 추가 치료가 필요한 경우 알려드립니다.

궁금한 점이 있으시면 주저하지 마시고 저희에게 즉각 알려주시기 바랍니다.

**1501 W. DUNDEE RD. #108 * BUFFALO GROVE, IL 60089
847-818-9950**