



## 마취후 주의사항

1. 귀가 운전시 반드시 안전벨트를 하십시오.
2. 마취 시술을 받으신 후에는 하루정도 쉬시는게 바람직합니다.
3. 마취 시술을 받은 후에는 위험한 기계를 작동하거나 혼자 외출하는 등의 스트레스를 받거나 경각심이 필요한 일이나 행동은 삼가셔야 합니다.(운전은 상관없음)
4. 치과의사나 치주전문의가 지시한 대로 약을 드셔야합니다.
5. 마취가 풀린 후의 진통을 해소시키기 위한 코딘 같은 마약류 성분이 함유된 진통제를 치주전문의로부터 처방받아 드신 경우, 치과 시술 당일의 활동 일부에 대해 잊어버리는 일시적인 기억감퇴를 겪으실 수도 있습니다. 이 경우 약물과다복용의 위험에 처할 수도 있습니다.
6. 외과적 수술후에는 적절한 수분섭취가 필요합니다. 8온스 정도의 물을 수술 당일 4~6컵 정도 마시는게 바람직합니다.
7. 수술후 메스꺼움을 느끼거나 구토증세를 보인다면 곧바로 저희 병원에 연락주십시오.
8. 비상상황인 경우에는 911로 연락, 응급처치를 받으십시오.
9. 치주전문의가 알려드린 수술후 조치사항을 그대로 따르셔야 합니다.

환자 서명 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

부모/법적 보호자 서명 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

증인 서명 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_